Doight du neigne

Juntanilimir<mark>adi markini</mark>

Vass8R11s046-050

duntinduntudantudantud



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1484







dintolontolontolontol

DESIGNATION Doight du meique

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6

Vigueur: 25

PORT: érig - 2 érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 28-74
Date de maturité: 28

Pourriture: 16
GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - M
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$10
\$20
\$30
aveo pépins - apyrène

\$42
\$50
JUS: Inc. - coloré

Juutanilaatas

DESIGNATION: Doight du neigne CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6 Vigueur: 3,5 PORT : érig - couché Millerandage: 0,5 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3.3-75 x+3 Pourriture: == 22 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG -G- N - P 24020 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 8 m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec (pépins) apyrène s2 0 s3 o JUS : (Ind.) - coloré \s4 1 s5 2

dominionionimimimimi

Année: 1970
Emplacement....4.7.A.6..... Désignation Doight du neigne

<u>!</u> !	Nombre			E S				
!	Total d'yeux	27.3	1-4	!	!	1	1	
1	2	0	2-4	!	!	!	!	
2	0			!	!	!	!	
31	7			!	!	!	!	
4 !	2	0	0	1	1	!	!	
5	2	1	2 1	!	1	!	!	
				06	1-4.70	+5		

! ! Nombre !! Total !	DATES							
! ! d'yeux!	30 3	2/4						
2) &		!						
4 4	1	2	D & 2-14-71 (+3!)					
5 2	1	1						

Année: 1977
Emplacement ... 4.7 Ab s. 4.5 Désignation Doight du neigne

rduntanlantanlantanlantand

	! Nomb ! Tot		D A T E S									
			19.3	153	!	!						
2	!	!	1	! !	!	!!!	An order of the second					
3	!	!	1	1	1	!!!!						
孝	!	!	!	1	! ple	10-3.77!	+4					
4	1 4	! 0	2 ,	13.	1	1 1						
5	1 4	! 1	1		!	!!!						

Dought du reigne (0445) ni
Véraison a 50 % 81
4 -7 A 6 04045 47-8 +2

Aprice: 1986
Emplacement. 8. R.M. S. M. S. S.C... Désignation. Doigth, du Neigne

Carlos and the second to the second the seco	! Nembre	DATES									
	! Total ! d'yeux	2.4	: 5.4	1	1 1	!					
1	! 4	. 0	2 ×	1	1	!					
2	6	1	2	!		i					
3	1 4	1 1	2/×	1	1	1					
1 -8	1 1	1	1 1	! !	1	1 1					
5 %	1	<u> </u>	1	!	<u>I</u>	1 1					

Dle 5.4.86 +M

ANNEE 1987 NOM Doigth du Neigne EMPLACEMENT 8 RM 1 46.50

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f			raisor mi/v		Maturité
3 4 5	46443	3.4 3.4 31.3 31.3	10,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4	0 5 4 2 1	5,5	10,6	14.6	17,6	3.8		108	the y

DESIGNATION: Digth du Neigni FMPLACDIENT: 8. RM Ah6. 50 Date de la vendange: 22.9.17 +5

Poids de la vendange : 5,850

Hombre de souches: 2 2,675 Date de Dézustation: 14 DEC. 1987

Nombre de grappes : 8 6699

Juntanilanta

Pourriture: 56

Couleur: N (Ic=0.217)

Indice réfract.: 16,8 (Nº26) 90

Acidité du moût : 4,5%

Date : 26 9

Pressurage

Densité : 1016

Date: 2.40

Nise en bouteille

Densité: 995 3/10

Degré alcoclique : 3,2 Acidité du vin :38

OBSERVATIONS : Note 25

ANNEE 1988 NOM Doigth du Neigne n EMPLACEMENT 8 RM 546.50

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité ⊀	Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v ×		Maturité
1 2 3 4	47634	4.4 5.4 5.4 1.5	5 4 4 4 5 4 5 4 5 4	3 0	2	3 .6	6.6	9.6	25.7	28.7	1.8	19-9
			5.4 +12	and the second s	out a /	0 /	6,6			+1		+5

Pourriture : 0 Port : buche ANNEE 1989 NOM Doigth du Neigne EMPLACEMENT 8 RM SHG-50 mi

Juntanifantiak

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb				oraiso mi/f		vé début	raison mi/v	ein	Maturité
2 3 . 4 . 5	68846		0 2 2 0	0,9	275	30{ +3	2.6				

Pourriture :

Mill. :

Port : Couche Vigueur : 4

dintindunturkeetuduutud

DOMAINE DE VASSAL

INTENSITE COLORANTE DU VIN (D.O. sous I m/m de trajet optique)

. Doigth du Neigne 8 RUSH6.50 0.086 0.131

Vinifications 1987

D 520

dinitialiantiadinitiadinitiad

0.217 0.66

Foight du neigne 4.7A6(s.G.5)

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

Juutmilimtu

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.duveteuses 8 - cotonneuses 9 4

44 - blanches ou fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à plages à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Doight de neigne

Désignation :

Juntanilanta

4.7 A 6 4.5

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Mervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux de duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autro 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Doight du neigne 4.7 A 6 (5-G-5)

Désignation : Emplacement:

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blackarjon 52 - vrille

rouge foncé 4.

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré vert 8.

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvors

Doigth du Neigne clos 8 R 11 s-46-50 (047)

Désignation : Emplacement :

Juatanhinto

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbo et nervures : glabre 2 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. //

34 - Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (séteux 6) - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - endulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 7 - entièrement

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autro 5.

PETTOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - 2 totalement (9)

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

. Calvo 85

```
Nº d'ordre :
                  Doigthe du aleigne
clos 8 R 11 s-46-50 (248)
Désignation :
Emplacement :
24 - Grosse 1 - Moye ne 2 - Petite 3. (dimensions: 20 \times 30)
24 - Lâche 4 - Moyena (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule no. v. sible 7 - visible 8 - long Q.
25 - A pédoncule horbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification 3.
25 - Axe de la rafle ol ré 4 - non coloré (5.)
26 - Très grosse 1 - Grove 2 - Hoyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière - irrégulière 8 (dimensions : 25 x 22).
27 - De couleur blanc 1 - ris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 🗇 pruine 8 - non pruinée 9.
     Coloration régulière (2) irrégulière 2.
38 - Forme : discoïde 0 - : 'lipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 coovoïde 5 - c lindroïde 6 -
              fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
                               8 - peu apparent 9
29 - 1 section transversal : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
53 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ( - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4
     herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long (1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - ir égulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 6.
     ' hourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
- - a pinceau : cort 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.
```

Juntandianta

Calvo 85

Dright du neigne 4.7A6 s.5 DEMCESIMATION / EMPLACEMENT / SARHENT DE VIGNE Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecoros

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (1), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds

: gris (1), jamme (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7),

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

DENOMINATION: Doigth du Neigne EMPLACEMENT: 8 KM & 46,50 (0.47)

Cordon pétiolaire : étroit (0) - large (2) : saillant (1) - effecé (2).

SARMENT DE VIGNE

uliminnimiententententuul

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :40.... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (3) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

```
N° d'ordre: ni Désignation: Doight du neigne
 Origine :
 Emplacement: d4 pl7 A6 &4 et5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B ..... ①-②- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - (3)
                 Forme
                      : 4 - (5).
                 Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

Juntanlaata

```
N° d'ordre :
Désignation : Doight du neigne
    Nº d'ordre :
    Emplacement: 8 11 46-50
                                     : 1 - 2 - 3
    Angle des nervures
                                     : 4 - 5 - 6
    Sexe
                                     : (7) - 8 - 9
    L_1/L_2
                                     : (10) - (11)
    L2/L
                                    : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
    Nombre de lobes
                                   : 17 - 18 - (19) - 20
    Prof. sinus latéral Sup.
                                   : 21 - 22 - 23 - 24
    Prof. sinus latéral Inf.
    Forme sinus pétiolaire 25 - 26 - 27 - 28 - 29
    Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
                                     : (267)
    Sinus pétiolaire ouvert
    Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                             : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
    Forme sinus-latéral Sup.
     Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                     : (271)
     Sinus latéral Supérieur ouvert
                                     : 40 - (41)
     Dents : forme
                                     : (42) - (43) - 44
     Dents (angle)
                                     : (45) - (46) - (17)
     Angle du lobe terminal
     Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
                                     : 60 - 61 - 62
     Angle des nervures L3 L'3
                                    : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
     Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües